

PENGARUH SELF EFFICACY TERHADAP PELAKSANAAN DETEKSI DINI KANKER SERVIKS METODE IVA DI PUSKESMAS KOTA KEDIRI

Eko Winarti¹, Fauzia Laili²,

^{1,2}D IV Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kediri,
ekowinarti@unik-kediri.ac.id

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine the relationship between self-efficacy and the implementation of IVA cancer early detection of cervical cancer in Puskesmas Kediri City. This research was conducted on unpregnant married woman on Kediri in 2016 who met the criteria: 1) a group of case, namely some women who were married, unpregnant and had carried out early detection of cervical cancer IVA method; 2) Control group, that is, some women who have been married, are unpregnant but have not implemented the early detection of cervical cancer in the IVA method. The subjects in this study are 410 peoples which were divided into case groups of 205 people and control groups of 205 people. The data collection used a questionnaire. Based on the results of research data analysis using logistic regression statistical tests obtained OR values: 3.3 (95% CI 2.1 - 5.2) with a significance level of 0.001. So it can be concluded that women who have big perceived self efficacy have an opportunity 3.3 times greater for conducting IVA examinations compared with women who are perceived less capable of self efficacy.

Keywords : *self efficacy, Early detection of cervical cancer, IVA examination*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self-efficacy terhadap pelaksanaan deteksi dini kanker serviks metode IVA di Puskesmas Kota Kediri. Penelitian ini dilakukan pada Wanita yang sudah menikah dan tidak sedang hamil di Kota Kediri tahun 2016 yang memenuhi kriteria: 1) kelompok case yaitu sebagian wanita yang telah menikah, tidak sedang hamil dan telah melaksanakan deteksi dini kanker serviks metode IVA; 2) Kelompok kontrol yaitu sebagian wanita yang telah menikah, tidak sedang hamil tetapi belum melaksanakan deteksi dini kanker serviks metode IVA. Jumlah subyek penelitian sebanyak 410 responden yang terbagi menjadi kelompok case 205 responden dan kelompok kontrol 205 responden. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner. Berdasarkan hasil analisis data penelitian dengan menggunakan uji statistik regresi logistik diperoleh nilai OR: 3,3 (95% CI 2,1 – 5,2) dengan taraf signifikansi 0,001. Maka dapat disimpulkan bahwa wanita yang mempunyai perceived self efficacy sangat mampu mempunyai peluang 3,3 kali lebih besar untuk melakukan pemeriksaan IVA dibandingkan dengan wanita yang perceived self efficacy kurang mampu.

Kata Kunci : *Self efficacy, Deteksi dini kanker serviks, Pemeriksaan IVA*

PENDAHULUAN

Kanker adalah merupakan salah satu penyakit penyebab kematian utama di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia pada tahun 2013, penyakit kanker serviks dan kanker payudara merupakan penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi yaitu kanker serviks sebesar 0,8% dan kanker payudara sebesar 0,5% (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Deteksi dini kanker serviks dan segera diberikan pengobatan terbukti efektif untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas kanker serviks, tetapi rata-rata kunjungan deteksi dini di Negara berkembang masih jauh dari yang diharapkan (Jia *et al.*, 2013; Donnelly, 2006). WHO menyatakan, saat ini penyakit kanker serviks menempati peringkat kedua diantara berbagai jenis kanker yang menyebabkan kematian pada wanita di dunia dan 85% terjadi pada wanita di Negara berkembang (Jia *et al.*, 2013; Jaspers *et al.*, 2011). Kanker serviks sebenarnya penyakit yang dapat dicegah dan dapat diobati jika diketahui sejak awal (McGee, 2015).

Berdasarkan data dari Globocan, *International Agency for Research on Cancer* (IARC) diketahui prevalensi kanker serviks di dunia mencapai 16 per 100.000 wanita (Wahidin, 2015). Berdasarkan Globocan 2012 di tahun 2012 terdapat 528.000 kasus kanker serviks di dunia (McGee, 2015). Indonesia merupakan Negara dengan kasus kanker serviks terbanyak kedua setelah Negara Cina (Irawati, 2012). Di Indonesia, setiap tahun diperkirakan 13.762 wanita didiagnosis terkena kanker serviks dan 7.493 mengalami kematian. Kanker serviks di Indonesia juga menempati peringkat kedua dari segi jumlah penderita kanker pada wanita setelah kanker payudara (Jaspers *et al.*, 2011).

Berdasarkan estimasi jumlah penderita kanker serviks dan kanker payudara terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Di Indonesia pada umumnya pasien kanker serviks yang berobat ke rumah sakit telah dalam stadium lanjut, yaitu: stadium IA dan IIA tercatat 28,6%, stadium IIB sampai IVB yang datang ke rumah sakit sebanyak 66,4% dan Program atau kegiatan deteksi dini yang dilakukan pada masyarakat hanya akan berhasil apabila kegiatannya dihubungkan dengan pengobatan yang adekuat, terjangkau, aman dan mampu dilaksanakan serta mencakup 80% populasi perempuan yang

berisiko. Agar dapat mengurangi jumlah perempuan yang tidak mendapat tindak lanjut penatalaksanaan setelah deteksi dini, diupayakan pengobatan segera dengan menggunakan pendekatan komprehensif. Pendekatan komprehensif atau dengan istilah dilihat dan diobati (*see and treat*) untuk pencegahan kanker leher Rahim yaitu melalui kunjungan sekali yaitu mengaitkan IVA dengan pengobatan krioterapi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015). Stadium IIB tercatat 37,7% (Khosidah & Trisnawati, 2015).

Cakupan pelaksanaan deteksi dini kanker serviks metode IVA di Indonesia masih rendah yaitu 2,45%, sehingga memerlukan upaya lebih kuat untuk mencapai target, yaitu deteksi dini 50% wanita usia 30-50 tahun selama 5 tahun (Wahidin, 2015). Pelaksanaan deteksi dini kanker serviks metode IVA di Kota Kediri masih rendah yaitu kurang dari satu persen dari target Dinas Kesehatan Kota Kediri yang ditetapkan 10% (Winarti, Santoso, & Hargono, 2017). Fenomena rendahnya perilaku deteksi dini kanker *serviks* dapat mengakibatkan meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas penderita kanker serviks di Indonesia. Kejadian kanker serviks akan sangat mempengaruhi hidup dari penderitanya dan keluarganya serta juga akan sangat mempengaruhi sektor pembiayaan kesehatan oleh pemerintah (Komite Penanggulangan Kanker Nasional, 2015). *Fogg Behavior Model* (FBM) atau model perilaku menurut Fogg juga disebutkan bahwa perilaku manusia terjadi karena tiga factor yaitu: motivasi, kemampuan (*ability*)/*self efficacy* dan pemicu (*trigger*). FBM juga menegaskan bahwa seseorang mau melakukan perilaku sasaran jika dia memiliki: 1) Motivasi yang cukup, 2) Kemampuan yang cukup untuk melakukan perilaku, dan 3) Pemicu yang efektif atau dipicu untuk melakukan perilaku (Fogg, 2009). Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik meneliti hubungan antara *self-efficacy* dengan pelaksanaan deteksi dini kanker serviks metode IVA di Puskesmas Kota Kediri.

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini adalah *self efficacy* dan pelaksanaan deteksi dini kanker serviks metode IVA. *Self efficacy* dalam penelitian ini adalah jawaban respon dan tentang kemampuan dirinya untuk

melaksanakan deteksi dini kanker serviks. Variabel ini diukur dengan menggunakan alat ukur kuesioner yang sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan variabel pelaksanaan deteksi dini kanker serviks metode IVA dalam penelitian ini adalah bentuk tindakan yang dilakukan responden berupa pelaksanaan deteksi dini kanker servik, diukur dengan lembar observasi. Sampel penelitian ini sebanyak 410 responden yang terbagi menjadi kelompok case 205 orang dan kelompok kontrol 205 orang. Penelitian ini dilakukan pada Wanita yang sudah menikah dan tidak sedang hamil di Kota Kediri tahun 2016 yang memenuhi kriteria: 1) kelompok case yaitu sebagian wanita yang telah menikah, tidak sedang hamil dan telah melaksanakan deteksi dini kanker serviks metode IVA; 2) Kelompok kontrol yaitu sebagian wanita yang telah menikah, tidak sedang hamil tetapi belum melaksanakan deteksi dini kanker serviks metode IVA. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner. Uji validitas telah dilaksanakan di Puskesmas Wilayah Kerja Kota Kediri dengan jumlah responden 32 orang. Berdasarkan hasil uji validitas terhadap instrumen penelitian diperoleh bahwa seluruh indikator pada kuesioner ini dianggap mampu mengukur variabel dalam penelitian ini, karena nilai probabilitas seluruh pertanyaan < 0,05 dan nilai probabilitas 0,774. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik komparasi, dengan menggunakan uji regresi logistik dengan bantuan program komputer.

HASIL

Responden penelitian yang digunakan sebanyak 410 responden yang terbagi menjadi kelompok case terdiri 205 orang dan kelompok kontrol terdiri 205 orang. Responden dipilih secara acak atau random dari wanita usia 20 – 50 tahun yang memenuhi kriteria dengan berbagai macam latar belakang baik pendidikan, pekerjaan, budaya dan sebagainya. Karakteristik responden baik pada kelompok yang melaksanakan pemeriksaan IVA maupun kelompok yang tidak melaksanakan pemeriksaan IVA. Pada kelompok yang melaksanakan pemeriksaan IVA dan yang tidak melaksanakan pemeriksaan IVA diketahui usia responden saat penelitian sebagian besar berusia ≥ 35 tahun yakni 68,3% dan 53,7%. Status pernikahan responden pada kelompok yang melaksanakan pemeriksaan IVA maupun pada kelompok yang tidak melaksanakan pemeriksaan IVA hampir seluruhnya juga menikah yakni 98,0% dan 95,6%. Pendidikan responden baik kelompok yang melaksanakan pemeriksaan IVA maupun kelompok yang tidak melaksanakan pemeriksaan IVA hampir separuhnya adalah pendidikan menengah (SMA sederajat) yakni 50,2% dan 47,8. Kelompok yang melaksanakan pemeriksaan IVA dan kelompok yang tidak melaksanakan pemeriksaan IVA, pekerjaan responden sebagian besar adalah ibu rumah tangga yakni 78,0% dan 62,9%. Pelaksanaan deteksi dini Kanker Serviks menurut *perceived self efficacy* sebagai berikut.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Variabel *Perceived Self Efficacy* dengan Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Serviks Di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Kediri

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
<i>Perceived Self Efficacy</i>	Kurang Mampu	114	27,8
	Sangat Mampu	296	72,3
Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode IVA	Ya	205	50
	Tidak	205	50

Tabel 2. Hubungan *Perceived Self Efficacy* Dengan Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Serviks Di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Kediri

Variabel	Kategori	Pelaksanaan Pemeriksaan IVA				Total		Nilai OR	CI 95%
		Ya		Tidak		N	Persen Tase		
		n	Persen tase	n	Persen tase				

<i>Perceived self efficacy</i>	Kurangmampu	34	29,8	80	70,2	114	100	<i>Ref</i>	
	Sangat mampu	171	57,8	125	42,2	296	100	3,3	2,1 – 5,2
									<i>P value =0,001</i>

Keterangan: **: *p value* <0.01 (signifikan), CI: Confidence Interval

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa sebgaiian besar responden mempunyai *perceived self efficacy* dalam kategori sangat mampu. Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui hasil analisis bivariabel antara *perceived self efficacy* dengan pelaksanaan IVA menunjukkan bahwa *perceived self efficacy* secara statistik memiliki hubungan yang bermakna dengan pelaksanaan IVA. Dilihat dari hasil analisis didapatkan OR: 3,3 (95% CI 2,1 – 5,2) pada *perceived self efficacy* sangat mampu, hal ini dapat disimpulkan bahwa wanita yang mempunyai *perceived self efficacy* sangat mampu mempunyai peluang 3,3 kali lebih besar untuk melakukan pemeriksaan IVA dibandingkan dengan wanita yang *perceived self efficacy* kurang mampu.

PEMBAHASAN

Efikasi diri (*self efficacy*) mengacu pada keyakinan sejauh mana individu memperkirakan kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas atau melakukan suatu tugas yang diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Keyakinan akan seluruh kemampuan diri meliputi kepercayaan diri, kemampuan menyesuaikan diri, kapasitas kognitif, kecerdasan dan kapasitas bertindak pada situasi yang penuh tekanan. Kepercayaan pada kemampuan diri seseorang untuk mempengaruhi perubahan dalam hasil (*self efficacy*) adalah kunci dari perubahan perilaku kesehatan (Onoruoiza, Musa, Umar, & Kunle, 2015). *Self efficacy* diri yang dimiliki seseorang dapat digunakan dalam memprediksi perilaku sehat dan dapat memfasilitasi modifikasi perilaku seseorang. Orang lebih cenderung mengadopsi perilaku kesehatan jika mereka berfikir mereka akan berhasil. Menurut (Bandura, 1994) *self efficacy* alam ditumbuhkan dan dipelajari melalui empat hal yaitu: pengalaman menguasai sesuatu, *modeling* sosial, persuasi sosial, kondisi fisik dan emosional. Tinggi rendahnya *efficacy* diri sesorang dalam tiap tugas sangat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang berpengaruh dalam

mempersiapkan kemampuan diri individu. Ada beberapa yang memengaruhi *efficacy* diri antara lain: budaya, jenis kelamin, sifat dari tugas yang dihadapi, intensi feksternal, status atau peran individu dalam lingkungan, informasi tentang kemampuan diri (Bandura, 1994). Faktor yang memengaruhi *self efficacy* yaitu pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung (Yansen Gultom, 2015).

Dchwarzer & Renner (2000) menyebutkan tiga prediktor utama yang memengaruhi niat seseorang adalah persepsi risiko, harapan *outcome* dan *coping self efficacy*. Dchwarner & Renner (2000) menyebutkan Individu yang mempunyai *self efficacy* baik akan mempunyai perilaku nutrisi yang baik. Niat merupakan prediktor utama untuk merubah perilaku.Niat dan *coping self efficacy* memengaruhi diet rendah lemak dan tinggi serat.

Simoni, *et.,all* (2006) menyebutkan bahwa *self efficacy* berkorelasi penting dengan kepatuhan meskipun tidak secara langsung dipengaruhi oleh dukungan sosial. Mungkin variabel lain seperti motivasi lebih berdampak langsung terhadap niat(Winarti, Santoso, & Hargono, 2018).

Hal ini sesuai dengan Fogg Behavior Model (2009) yang disebutkan bahwa perilaku manusia terjadi karena tiga factor yaitu: motivasi, *ability* dan pemicu (*trigger*). Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dan menguatkan teori yang ada.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh *self efficacy* terhadap pelaksanaan deteksi dini kanker serviks metode IVA di Puskesmas Kota Kediri. Semakin seorang wanita merasa dirinya mampu melaksanakan pemeriksaan IVA maka wanita tersebut akan semakin melaksanakan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks metode IVA

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara *self efficacy* dengan pelaksanaan deteksi dini kanker serviks metode IVA di Kota Kediri, sehingga diharapkan kepada pengambil kebijakan di Kota Kediri untuk mengembangkan program pendidikan kesehatan tentang deteksi dini kanker serviks yang dapat meningkatkan *self efficacy* seorang wanita. Cara untuk meningkatkan *self efficacy* pada wanita dalam melaksanakan deteksi dini kanker serviks metode IVA yaitu : 1) Melakukan pendidikan kesehatan dengan cara melibatkan wanita yang sudah pernah atau rutin melaksanakan pemeriksaan IVA ; 2) Mengikutsertakan suami dalam proses penyuluhan dan 3) Pemutaran film tentang kanker serviks dan upaya pencegahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1994). Self-Efficacy. *Encyclopedia of Human Behavior*, 4(1994), 71–81. <https://doi.org/10.1002/9780470479216.corpsy0836>
- Donnelly, T. T. The Health-Care Practices of Vietnamese-Canadian Women : Cultural Influences on Breast (2006).
- Fogg, B. J. (2009). A Behavior Model for Persuasive Design.
- Irawati, B. (2012). Regression (GPR) dan Regresi Binomial Negatif, 2(2), 13–24.
- Jaspers, L., Budiningsih, S., Wolterbeek, R., Henderson, F. C., & Peters, A. A. W. (2011). Parental acceptance of human papillomavirus (HPV) vaccination in Indonesia: A cross-sectional study. *Vaccine*, 29(44), 7785–7793. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.07.107>
- Jia, Y., Li, S., Yang, R., Zhou, H., Xiang, Q., Hu, T., & Zhang, Q. (2013). Knowledge about Cervical Cancer and Barriers of Screening Program among Women in Wufeng County , a High-Incidence Region of Cervical Cancer in China, 8(7), 2–9. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0067005>
- Komite Penanggulangan Kanker Nasional. (2015). *Panduan Penatalaksanaan Kanker Serviks*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2015). *Stop Kanker*. Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan RI.
- Khosidah, A., & Trisnawati, Y. (2015). Faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga dalam melakukan TES IVA sebagai upaya deteksi dini kanker serviks. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 6(2), 94–105.
- McGee, P. (2015). Cervical Cancer, 12(Supplement 2), 77–80. <https://doi.org/10.1093/annonc/mds193>
- Onoruoiza, S. I., Musa, A., Umar, B. D., & Kunle, Y. S. (2015). Using Health Beliefs Model as an Intervention to Non Compliance with Hypertension Information among Hypertensive Patient. *International Organization of Scientific Research Journal Of Humanities And Social Science*, 20(9), 11–16. <https://doi.org/10.9790/0837-20951116>
- Wahidin, M. (2015). Deteksi dini kanker leherrahim dan kanker payudara di Indonesia 2007-2014. *Buletin Jendela Dan Data Informasi Kesehatan*, 1(1), 12–15.
- Winarti, E., Santoso, B., & Hargono, R. (2017). Psychosocial Factors are Associated with Participation in Cervical Cancer Screening Programs : A Structural Equations Model, 7(10), 32–39.
- Winarti, E., Santoso, B., & Hargono, R. (2018). Health Notions , Volume 2 Number 4 (April 2018) Trigger , Self Efficacy and Motivation in The Implementation of Cervical Cancer Screening 494 | Publisher : Humanistic Network for Science and Technology Health Notions , Volume 2 Number 4 (April 2018) ISSN 2580-4936 495 | Publisher: Humanistic Network for Science and Technology, 2(4), 494–499.
- Yansen Gultom. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Pengalaman spesifik, dan Self Efficacy Terhadap Kinerja..., VI(01), 36–53.